

WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD: 4 YEARS

(Meets EPSDT Guidelines)

DATE	
------	--

유년기 초기 (4세)						
	아동의 이름	포- (4·1) 생년윌일				
		· 한 단 월 월				
		## H0#12 ou oht				
	알레르기 문제	현재 복용하고 있는 약품				
<u> </u>	지난 방문 이후 질병/사고/문제/염력사항 등					
前						
수 수 수 수 수 수 수 수						
÷ ₹0						
1	예 아니오 예	아니오				
혀	아이는 음식을 다양하게 섭취합니다.	아이는 한쪽 발로 뜀뛰기를 할 수 있습니다.				
머 가						
	└──	아이는 노래를 부릅니다.				
	아이 스스로 옷을 입을 수 있습니다.					
		1				
WEIGHT K	G./OZ. PERCENTILE HEIGHT CM/IN. PERCENTILE BLOOD PRESSURE					
		Diet				
Re	eview of systems Review of family history					
		Elimination				
		Sleep				
Screer	ning: MHZ R L	Hct/Hgb Dental Referral Tb Lead Exposure				
Hearin	g Screen 4000					
	2000	Fluoride Supplements Fluoride Varnish				
	1000	Review Immunization Record				
	500	Health Education: (Check all completed)				
Vision	Screen 20/ 20/	Nutrition Limit TV/Computer Time Development				
VISIOII	N A					
Develo		Regular Physical Activities Car Safety/ Booster Seat				
Behavi	· <u> </u>	Safety Passive Smoking Discipline/Limits				
Social	Emotional					
Gross	Motor	Helmets Child Care				
Fine M	otor	Other:				
Physic		Assessment:				
1						
	al appearance Chest					
Skin	Lungs					
Head	Cardiovascular/Pulses					
Eyes	Abdomen					
Ears	Genitalia					
Nose	Spine					
1	arynx/Teeth Extremities					
Neck	Neurological					
Nodes	Gait U					
	Health	IMMUNITATIONS CIVEN				
Descril	pe abnormal findings:	IMMUNIZATIONS GIVEN				
		REFERRALS				
		NEI ERIVALO				
	NEVT VIOLE, E VEADO OF A OF	HEALTH PROVIDER NAME				
	NEXT VISIT: 5 YEARS OF AGE					
HEALTH I	PROVIDER SIGNATURE	HEALTH PROVIDER ADDRESS				
DSHS 13-684C KO (REV. 08/2001) SEE DICTATION						

DISTRIBUTION: White - Physician Yellow - Parent/Guardian

Guidance to Physicians and Nurse Practitioners for Early Childhood (4 years)

The following highlight EPSDT screens where practitioners often have questions.

They are not comprehensive guidelines.

Fluoride Screen

Check with local health department for fluoride concentration in local water supply, then use clinical judgment in screening. Look for white spots or decay on teeth. Check for history of decay in family.

Lead Screen

Screen children for these risk factors:

- Live in or frequently visit day care center, preschool, baby sitter's home or other structure built before 1950 that is dilapidated or being renovated.
- Come in contact with other children with known lead toxicity (i.e., blood lead 15 ug/dl).
- Live near a lead processing plant or with parents or household members who work in a lead-related occupation (e.g., battery recycling plant).

Hepatitis B Vaccine

 For children and adolescents not vaccinated against hepatitis B in infancy, begin the hepatitis B vaccine series during any childhood visit. Give the second dose at least one month after the first dose and give the third dose at least four months after the first dose and at least two months after the second dose. Hepatitis B vaccine is required for school entry.

Developmental Milestones

Always ask parents if they have concerns about development or behavior. You may use the following screening list, or use the Ages and Stages Questionnaire, the Denver II, or the MacArthur Communications Development Inventory.

Yes	No	
		Dresses with supervision.
		Plays games with other children (e.g., tag).
		Says what to do when tired, cold, hungry.
		Says first and last name when asked.
		Walks up and down stairs, alternating feet.
		Balances on each foot for 2 seconds.
		Copies a circle.
		Inappropriate play with toys/no pretend play.

Instructions for developmental milestones: At least 90% of children should achieve <u>the underlined milestones</u> by this age. If you have checked "no" on *even one* of the underlined items, or if you have checked the **boxed item** (abnormal behavior at this age), refer the child for a formal developmental assessment.

Notes: Immunization schedules are from the Advisory Committee on Immunization Practice of the U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Parents and providers may call Healthy Mothers, Healthy Babies with questions or concerns on childhood development.



DSHS 13-684C KO (REV. 08/2001)

건강진단 - 유년기 초기 (4세)

WELL CHILD EXAM - EARLY CHILDHOOD: 4 YEARS (EPSDT 지침 준수)

날짜	

구술 참조

(El ODI TE ET)							
			유년기	초기 (4세)			
	아동의 이름				생년윌일		
	알레르기 문제			현재 복용하고 있는 약품			
<u>~</u>	지난 방문 이후 질병/사고/문제/염력사항 등						
는 하							
아이가 현 작성함							
ੇ ਲਾ	예 아니오		———	아니오			
न		아이는 음식을 다양하게 섭취합니다.		아이는 한쪽 발로 뜀뛰기를 할 수			
마 -		아이는 다른 아이들과 잘 어울립니다.		아이는 노래를 부릅니다.			
		아이 스스로 옷을 입을 수 있습니다.					
체중 KG./OZ	백분율	신장 CM/IN. 백분율 혈압					
				식사			
신:	 체검사	가족병력검토					
	- •			배설 (대/소변)			
검사항	모.			수면			
		MHZ R L		Hct/Hgb	Tb		
청력검		4000		불소보충 불소처리			
		2000 1000		예방접종 기록 검토			
		500		보건교육: (해당항목 전체 체크)			
시력검·	사	20/ 20/		영양 TV/컴퓨터 시간 :	제한 발육(밬닼)상태		
. , .	•	N A					
발달 ^	항			규칙적인 운동(활동) 부			
행동 사				안전 간접흡연 징	계/제약		
	서적 사항			헬멧 탁아소			
	동근육(신경)			기타:			
정밀 운	동근육(신경)						
신체:		N. A	N. A	명가:			
는 ". 외모		N A 	N A				
피부							
머리							
눈 목부							
귀 생식기 [
코		척추					
구 강인 5 -	투/치악	수족(손발)					
목		신경					
관절 걸음걸이 실음걸이 성신건강							
			예방접종				
이상 건강에 대한 의견:							
			의뢰				
다음 방문: 5세			진찰자 성명				
진찰자 서	ਰ ਰ			진찰자(진료원) 주소			

유년기 초기: 4세

4세 아동의 건강

성장 과도기

4세에서 5세 사이 아이의 신체 발욱 범위들

층계를 잘 오르내립니다.

가볍게 뜁니다.

좀 더 긴 문장으로 말합니다.

어제 일어난 일들이나 내일 일어날 일들에 관해 이야기 합니다

손가락으로 셀 수 있습니다.

일부 알파벳을 알아 봅니다.

집주소와 전화번호를 기억합니다.

옷으로 흉내놀이를 합니다.

아이가 새로운 기술을 배우는 데 도움이 되도록 아이와 대화하고 놀아줍니다.

도움이나 상세한 정보를 원할 때

논하기 어려운 문제 등을 주제한 어린이용 서적에 관한 정보:지역의 보건부나 공공도서관의 어린이 도서담당 사서에게 문의할 수 있습니다.

아이에게 화재 안전수칙을 가르키는 데 도움을 줄 수 있는 곳: 지역에 있는 소방소의 소방관과 대화를 나눕니다

건강 정보

자녀가 취학하기 전에 일정한 예방접종이 필요합니다. 지금부터 준비하십시오, 특정 백신을 기피할 경우에는 면제 양식에 서명해야 합니다.

매일 적어도 다섯 번은 자녀에게 약간의 과일과 약채를 주십시오. 과일과 약채는 건강식인데다 좋은 간식이 됩니다.

충분한 수면을 취하도록 하면 아이들은 더 행복감을 느끼고 학습 능력도 향상됩니다! 일찍 잠들도록 하여 밤에는 10-12시간 정도 수면을 취하게 하십시오. 잠자리에 드는 시간을 규칙적으로 하면 아이도 그에 순응하게 됩니다. 잠들기 전에 같이 책을 읽거나 대화를 나누십시오.

양육 정보

아이가 화가 났을 때나 슬플 때에 그 이유를 말로 표현하도록 격력해 줍니다. 당신이 직접 행동으로 보이면 아이가 그 방법을 배우게 됩니다.

매일 자녀와 함게 책을 읽고 퍼즐을 풀거나 밖에서 활동적으로 게임을 즐기는 시간을 갖도록 하십시오.

아이들은 자연히 자신의 신체에 호기심을 가지게 됩니다. 간단하고 솔직한 대답을 들으면 아이는 자신의 몸에 아무런 문제가 없다고 느끼게 됩니다. 성기를 가리킬 때는 실제 명칭을 사용하십시오.

안전정보

몸집이 큰 아이에겐 부스터(booster) 카 시트를 사용하십시오! 성인용 좌석 벨트를 착용할 수 있기 전까지는 뒷좌석에 무릎/어깨 벨트가 달린 부스터를 사용하십시오. 곧 부스터가 필요하게 되며 6살 또는 몸무게가 60파운드가 될 때까지 사용합니다.

아이가 집주소와 전화번호를 알고 있도록합니다. 비상시 911에 전화하는 방법을 가르쳐주십시오. 전화로 도움을 요청해야 할 때에는 전화를 끊지 않고 계속 들고 있도록 말해주십시오. 집에서 장난감 전화기로 연습해봅니다.

옷에 불이 붙었을 때는 행동을 멈추고 몸을 바닥에 구르도록 가르쳐 주십시오